COROLLA-505™

Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC
(Systemic and Contact Insecticide)

It is emulsifiable concentration containing active ingredient Chlorpyriphos 50% w/w cypermethrin 5% w/w balance emulsifiers and solvent. It effectively controls pest complex on cotton. *Caution : Toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. It is toxic to honeybees, spray application should be avoided during foraging period of bees. Product is highly toxic to birds hence avoid use near bird habitat.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha		Dilution in water (Liters)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (Litre)			
Cotton	*Aphid, Thrips, Jassids, Whitefly, American bollworm, Pink bollworm, Spotted bollworm, Spotted litura*	500 + 50	1.000	500-1000	15	—
Rice (Paddy)	*Stem borer, Leaf folder*	312 + 32 to 375 + 38	0.625-0.750	500-700	15	—

Direction of Use: Depending upon the stage of the crop increase or decrease the quantity of water. Plant Protection Equipment: Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer, and ASPEE-HTP power sprayer fitted with hollow cone nozzle.

Time of Application:

Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning: Headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, diarrhoea, convulsions, excessive sweating, lacrimation and salivation allergic manifestation may occur.

First Aid: 1. If swallowed, do not induce vomiting or give liquid orally. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity:

Antidote: 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. 3. Antihistamines may be given for allergic manifestation.

Disposal Of Used Container: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of insecticide and operators to dispose packages or surplus materials and washings from the machines in a safe manner, so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles or shall be kept in seperate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition:

Chlorpyriphos a.i. (Min. purity 94%) : 50.00% w/w
Cypermethrin a.i. (Min. purity 92%) : 5.00% w/w
Emulsifier A : (Blend of Calcium Salt of Alkyl benzene sulphonic acid & poly oxy ether of nony phenol) : 5.60% w/w
Emulsifier B : (Blend of Calcium Salt of Alkyl Benzene Sulphonic acid & Polyethonoxy Propoxy ether of Fatty alcohol) : 2.40% w/w
Aromatic Hydrocarbon solvent (like Aromex) Q.S.%
Total : 100% w/w

Not to be used on crops other than specified on this Label/Leaflet.

कोरोला-505™

क्लोरपायरिफॉस 50 प्रति. + सायपरमेथ्रिन 5 प्रति. ई.सी.
अंतप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

यह एक इमल्सीफायेबल कोन्सेन्ट्रेट है जिसमें सक्रिय तत्व क्लोरोपायरीफॉस ५० प्रतिशत भार / भार, सायपरमेथ्रिन ५ प्रतिशत भार / भार तथा बाकी इमल्सीफायर्स और सालवेन्ट है। यह कपास के कीड़ों के संक्रिमण को असरकारक रुप से नियंत्रित करता है। * सावधान : जलीय जीवों के लिए जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह मधुमक्खियों के लिए जहरीला है, इसलिए जब मधुमक्खियाँ सक्रिय हों उस समय इसका छिड़काव न करें। यह उत्पाद पक्षियों के लिए अत्यधिक विषैला है इसलिए पक्षी आवास के निकट उपयोग से बचें।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	संरचना (ली.)			
कपास	माहू, चुरदा, तैला, सफेद मक्खी, अमेरिकन डोंडे की सूंडी, गुलाबी डोंडे की सूंडी, चित्तीदार डोंडे की सूंडी, तम्बाकू की सूंडी	500 + 50	1.000	500-1000	15	—
धान	तना छेदक, पत्ती मोड़क	312 + 32 से 375 + 38	0.625-0.750	500-700	15	—

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश: पानी की मात्रा फसल की अवस्था और छिड़काव के अनुसार कम या अधिक करें। उपयोग में आने वाले यंत्र– नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.पी.ई.–एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि जिसमें खाली कोण नोजिल लगा हो।

प्रयोग का समय:

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: 1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुँह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। 3. छिड़काव की वाष्प को इंगार अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण: सिरदर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना, मितली, उल्टी, दस्त, झटके (मिरगी), अधिक पसीना आना, आंसू आना, लार टपकना, एलर्जी हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: 1. यदि निगल जाये तो उल्टी न कराये या मुँह द्वारा कोई द्रव न दें। 2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 3. यदि आँखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10–15 मिनट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविषाक्तता:

विष नाशक: 1. रोगी को तुरंत एट्रोपिन दीजिए और इसकी 2 से 4 मिग्रा. तक की खुराक 5 से 10 मिनट के अन्तराल पर अन्तःशिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक 25 से 50 मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती है। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है। 2. 1 से 2 ग्राम 2 पी.ए.एम. 10 मि.ली. आसुल जल में घोलकर अन्तःशिरा बहुत धीरे–धीरे 10 से 15 मिनट में देना चाहिए। 3. एलर्जी के लिए एन्टिहिस्टेमिन्स दिये जा सकते है।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. कीटनाशक के डिब्बों को अलग–अलग कमरों या अलमारियों में जोकि अन्य कमरों तथा अलमारियों से जिनमें अन्य वस्तुएं विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किए जाते है से दूर अन्य कमरों से दूर अलग–अलग कमरों में या अलमारियों में ताला चाबी में बंद रखें। 2. जिन कमरे या अलमारियों में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त, हवादार व पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये ताकि कीटनाशक के माप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न हो।

संग्रहण की शर्तें: 1. कीटनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या अलमारी में ताला कुन्ची लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। 2. कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त, हवादार, पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये जिससे कि कीटनाशक के माप से प्रदूषण होने का डर न हों।

रासायनिक संरचना:

क्लोरपायरिफॉस टेक्निकल
(न्यूनतम शुद्धता 94 प्रतिशत) : 50.00% भा/भा
सायपरमेथ्रिन स.त. (न्यूनतम शुद्धता 92 प्रतिशत) : 5.00% भा/भा
इमल्सिफायर अ (ब्लैंड ऑफ कैल्शियम सल्ट ऑफ अल्काईल बेन्जीन सल्फोनिक एसिड एण्ड पोली ओक्सी ईथर ऑफ नोनी फिनोल) : 5.60% भा/भा
इमल्सिफायर ब (ब्लैंड ऑफ कैल्शियम सल्ट ऑफ एल्काइल बेन्जीन सल्फोनिक एसिड एण्ड पोलीइथोनाक्सी प्रोपोक्सी इथर ऑफ फैटी अल्कोहल) : 2.40% भा/भा
ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन घोलक (एरोमेक्स) : पर्याप्त मात्रा %
कुल : 100% भा/भा

इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

कोरोला-505™

क्लोरपायरीफॉस 50% + सायपरमेथ्रीन 5% EC
(प्रणालीगत आणि संपर्क कीटकनाशक)

हे एक इमल्सिफायबल कॉन्सन्ट्रेट आहे, ज्यामध्ये सक्रिय घटक क्लोरपायरीफॉस ५०%/ आणि सायपरमेथ्रिन ५%/ तसेच उर्वरित इमल्सिफायर्स आणि विलायक आहेत. हे कापूस पिकावरील कीड समूहाचे प्रभावी नियंत्रण करते.

सूचना: जलीय जीवांसाठी विषारी असल्याने याचा वापर जलचोर, मत्स्यपालन किंवा पिसीकल्चरजवळ करू नये. हे मधमाशांसाठी विषारी आहे, म्हणून मधमाशांच्या संचार/चरणसंकलनाच्या कालात फवारणी टाळावी. हे उत्पादन पक्ष्यांसाठी अत्यंत विषारी आहे, म्हणून पक्ष्यांच्या अधिवासाजवळ वापर टाळावे.

शिफारस:

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर		पाण्यात विरळ-वणे (लिटर)	शेवटच्या फवारणी-पासून काप्णीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक वापरानंतर पुनःप्रवेश (तासांमध्ये)
		AI (ग्रॅम)	फॉर्मु-लेशन (मिली)			
कापूस	मावा, फुलकिडे, तुडतुडे, पांढरी माशी, अमेरिकन बोंडअळी, गुलाबी बोंडअळी, ठिपकेदार बोंडअळी, पाने खाणारी ठिपकेदार अळी (लिटूरा)	500 + 50	1.000	500-1000	15	—
धान	खोड वेधक, लिफ फोल्डर	312 + 32 to 375 + 38	0.625-0.750	500-700	15	—

वापरासाठी सूचना: पीक कोणत्या टप्प्यात आहे हे पाहून पाण्याचे प्रमाण वाढवावे किंवा कमी करावे. वनस्पती संरक्षण उपकरण: नॅपसॅक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर आणि पोकळ कोन नोझल बसवलेले अस्पी-एचटीपी पॉवर स्प्रेयर.

वापरण्याची वेळ

सावधगिरी: 1. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थांचे रिकामे डबे आणि पशुखाद्या यापासून दूर ठेवावे. 2. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळावा. 3. स्प्रे मिस्त्वा श्वास घेणे टाळावे. हवेच्या दिशेने फवारणी करावी. 4. फवारणीनंतर दूषित कपडे, शरीराचे भाग व्यवस्थित धुवावे. 5. फवारणी करताना धूम्रपान करू नये, काही खाऊ, पिऊ आणि चघळू नये/ 6. मिश्रण करताना आणि फवारणी करताना पूर्ण संरक्षक कपडे घालावे.

विषबाधेची लक्षणे: डोकेदुखी, चक्कर, व्हर्टिगो, मळमळ, उलट्या, अंधुक दिसणे, अतीसार, आकडी, खूप जास्त घाम येणे, अश्रू येणे आणि लाळ येणे, ॲलर्जी प्रकट होणे असे होऊ शकते.

प्रथमोपचार: 1. गिळल्यास, उलटी करण्यास भाग पाडू नका किंवा तोंडावाटे द्रवपदार्थ देऊ नका. 2. कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास कपडे काढा आणि दूषित त्वचा भरपूर प्रमाणत साबण आणि पाणी वापरुन धुवा. 3. डोळे दूषित झाल्यास भरपूर मीठ द्रव / स्वच्छ पाण्याने जवळपास 10 ते 15 मिनिटे धुवावे. 4. श्वास घेतला असल्यास, रुग्णाला ताज्या हवेत घेऊन जावे.

वनस्पती-विषाक्तता:

उतारा: 1. रुग्णाला लगेच ॲट्रोपिनाइझ करावे आणि 5 ते 10 मिनिटांच्या अंतराने शिरेतून 2 ते 4 मिग्रा. ॲट्रोपिन सल्फेटचा डोझ वारंवार द्यावा. एका दिवसात 25 ते 50 मिग्रा. ॲट्रोपिनची गरज पडू शकते. लक्षणे सतत राहिल्यास पुढे ॲट्रोपिन देण्याची आवश्यकता निश्चित होते. डोस समायोजनासाठी लाळेचे प्रमाण हा एक उपयुक्त निकष आहे. 2. 10 मिली डिस्टील्ड पाण्यात 1-2 ग्रा. 2 PAM विरघळवावे आणि 10-15 मिनिटे अतिशय हळूहळू शिरेतून द्यावे. 3. ॲलर्जी प्रकट झाल्यास ॲंटिहिस्टामिन्स देता येतील

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: 1. पर्यावरणीय किंवा जलप्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्री आणि मशिनमधील धुवणाची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे काम उत्पादक, कीटकणाशकाचे फॉर्म्युलेटर्स आणि वापरकर्त्यांचे आहे. 2 . वापरलेल्या पॅकेजचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी ते बाहेर टाकू नये. 3. पॅकेजेस मोडून वस्तीपासून दूर पुरावे.

साठवण अटी: 1. कीटकनाशक असलेले पॅकेजेस स्वतंत्र खोल्यांमध्ये साठवावे किंवा इतर वस्तू साठवण्यासाठी वापरण्यात येणार्या खोल्या किंवा जागेपासून दूर साठवावे किंवा कीटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरुपानुसार स्वतंत्र अलमारीत कडी-कुलूपात ठेवावे. 2. कीटकनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा जागा व्यवस्थित बांधलेल्या, प्रकाशमान आणि हवेशीर व पुरेशा मोठ्या असाव्या.

रासायनिक रचना:

क्लोरपायरीफॉस ए.आय. (किमान शुद्धता 94%): 50.00% w/w
सायपरमेथ्रीन ए.आय. (किमान शुद्धता 92%): 5.00% w/w
इमल्सिफायर ए: (अल्किल बेन्झिन सल्फॉनिक ॲसिडचे कॅल्शियम सॉल्ट आणि नोनी फिनॉलचे पॉली ऑक्झि इथर यांचे मिश्रण): 5.60% w/w
इमल्सिफायर ब: (अल्किल बेन्झिन सल्फॉनिक ॲसिडचे कॅल्शियम सॉल्ट आणि फॅटी अल्कोहोलचे पॉलिइथॉर्नॉक्झी प्रोपॉक्सी इथर यांचे मिश्रण): 2.40% w/w
ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन सॉल्व्हेंट (ॲरोमेक्ससारखे): Q.S.%
एकूण: 100.00% w/w

या लेबल/पत्रकावर नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.

ક્રોરોલા - 505 ™

ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રિન 5% EC
(પ્રણાલીગત અને સંપર્ક જંતુનાશક)

આ ઇમલ્સિફાયેબલ કોન્સન્ટ્રેટ છે, જેમાં સક્રિય ઘટક ક્લોરપાયરીફોસ 50% w/w અને સાયપરમેથ્રિન 5% w/w તેમજ બાકી ઇમલ્સિફાયર્સ અને દ્રાવક સામેલ છે. તે કપાસના પાકમાં જીવાત સમૂહનું અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે.

સાવચેતી: જળીય સજીવો માટે ઝેરી હોવાથી તેનો ઉપયોગ જળાશય, માછીમારી કે મત્સ્ય ઉછેર નજીક કરવો નહીં. તે મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે, તેથી મધમાખીઓના ચરવાની/પરાગસંચરણની અવધિ દરમિયાન છંટકાવ ટાળવો. આ ઉત્પાદન પક્ષીઓ માટે અત્યંત ઝેરી છે, તેથી પક્ષીઓના વસવાટ વિસ્તાર નજીક ઉપયોગ ટાળવો.

ભલામણો:

પાક(ઓ)	કિટકોના સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર		પાણીની માત્રા (લિટર)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધી રાહ જોવાની અવધિ (દિવસો)	ફરીથી પ્રવેશ (કલાકોમાં)
		સક્રિય ઘટક (ગ્રામ)	સંરચના (મિલિ)			
કપાસ	મોલો મશ્કર, થ્રિપ્સ, લીલા તડતડિયા, સફેદ માખી, અમેરિકન ઇંડાળ, ગુલાબી ઇંડાળ, ટપકાં વાળી ઇંડાળ, ટપકાં વાળી ઇંડાળ લીટૂરા	500 + 50	1.000	500-1000	15	—
ચોખા (ડાંગર)	થડ વેધક, પાંદડા વાળનાર	312 + 32 to 375 + 38	0.625-0.750	500-700	15	—

ઉપયોગ માટે દિશાસૂચન: પાકના તબક્કાના આધારે પાણીની માત્રામાં વધારો અથવા ઘટાડો. છોડ સંરક્ષણ સાધનો : નેપસેક સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નેપસેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નેપસેક બેટરી સ્પ્રેયર, અને હોલો કોન નોઝલ બેસાડવામાં આવેલ ASPEE-HTP પાવર સ્પ્રેયર.

અમલનો સમય:

સાવચેતીઓ: 1. ખાદ્ય પદાર્થો, ખાદ્ય પદાર્થોના ખાલી ડબ્બા અને પશુઓના ખોરાકથી દૂર રાખો. 2. મોં, આંખો અને ત્વચા સાથેના સંપર્કને ટાળો. 3. છંટકાવની ભાષ્પને શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. પવનની દિશામાં છંટકાવ રો. 4. છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઈ લો. 5. છંટકાવ કરતી વખતે ધૂમ્રપાન ન કરો, કઈ ખાશો કે પીશો નહીંઅને કંઈપણ ચાવશો નહીં. 6. મિશ્રણ તૈયાર કરતી વખતે અને છંટકાવ કરતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો.

ઝેરના લક્ષણો: માથાનો દુઃખાવો, ચક્કર આવવા, ગભરામણ, ઉબકા, ઉલટી, ધૂંધળી દ્રષ્ટિ, ઝાડા, આંચકી, વધુ પડતો પરસેવો, આંસુ આવવા અને લાળ પડવી, એલર્જીક અભિવ્યક્તિ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર : 1. જો ગળી જવામાં આવેલ હોય, તો ઉલટી માટે પ્રેરિત ન કરો અથવા મોં વાટે કોઈ પ્રવાહી ન આપો. 2. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત હોય, તો કપડા કાઢી નાખો અને દૂષિત ત્વચાને પુષ્કળ પ્રમાણમાં સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લો. 3. જો આંખો દૂષિત હોય, તો લગભગ 10 થી 15 મિનિટ સુધી પુષ્કળ સલાઈન વોટર/સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લો. 4. જો શ્વાસમાં લેવાઈ ગયેલ હોય, તો દર્દીને તાજી હવામાં ખસેડો.

વિષબાદપતા:

વિષમારણ : 1. દર્દીને તાત્કાલિક એટ્રોપિનાઇઝ કરો અને 5 થી 10 મિનિટના આંતરે 1 થી 4 મિલિગ્રામ એટ્રોપિન સલ્ફેટના વારંવાર ડોઝ આપીને સંપૂર્ણ એટ્રોપિનાઇઝેશન જાળવી રાખો. દિવસમાં 25 થી 50 મિલિગ્રામ એટ્રોપિન જરૂરી હોઈ શકે છે. એટ્રોપિન આપવાની વધારે જરૂરિયાત લક્ષણોના સાતત્ય દ્વારા માર્ગદર્શન આપે છે. લાળનું પ્રમાણ ડોઝ ગોઠવવા માટે ઉપયોગી માપદંડ છે. 2. 10-15 મિનિટ માટે ખૂબ જ ધીમે ધીમે નસમાં ઇન્જેક્ટ કરો. 3. એલર્જીક અભિવ્યક્તિ માટે એન્ટિહિસ્ટેમાઈન્સ આપી શકાય છે.

વપરાયેલા ડબ્બાઓનો નિકાલ: 1. જંતુનાશકોના ઉત્પાદકો, તૂરમો તૈયાર કરનારાઓ અને સંચાલકોની ફરજ રહેશે કે તેઓ પડીકાં અથવા વધારાની સામગ્રી અને મશીનોમાંથી ધોવાણનો સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરે, જેથી પર્યાવરણીય અથવા જળ પ્રદૂષણ અટકાવી શકાય. 2. પરપરાયેલા પડીકાંનો ફરીથી ઉપયોગ અટકાવવા માટે તેમને બહાર રઝળતા છોડી શકાશે નહીં. 3. પડીકાંને તોડીને રહેઠાણથી દૂર દાટી દેવા જોઇએ.

સંગ્રહની શરતો : 1. જંતુનાશક ધરાવતા પડીકાંને અન્ય વસ્તુઓ, ખાસ કરીને વસ્તુઓ સંગ્રહવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઓરડા અથવા જગ્યાઓથી દૂર અલગ ઓરડા અથવા જગ્યાઓમાં સંગ્રહિત કરવા જોઇએ અથવા જંતુનાશકના જથ્થા અને પ્રકૃતિના આધારે અલગ કબાટમાં તાળું વાસીને રાખવા જોઇએ. 2. જંતુનાશક સંગ્રહ કરવા માટે બનાવવામાં આવેલા ઓરડા અથવા જગ્યાઓ સારી રીતે ચણવામાં આવેલા, સૂકા, સુપ્રકાશિત અને હવાની અવરજવરવાળા તથા પૂરતા પરિમાણોના હોવા જોઇએ.

રાસાયણિક સંચયના:

ક્લોરપાયરીફોસ સ.ત.
(ઓછામાં ઓછી શુદ્ધતા 94%) : 50.00% w/w
સાયપરમેથ્રિન સ.ત.(ઓછામાં ઓછી શુદ્ધતા 92%) : 5.00% w/w
ઇમલ્સિફાયર A: (અલ્કાઇલ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડના કેલ્શિયમ મીઠા અને નોની ફિનોલના પોલીઓક્સી ઇથરનું મિશ્રણ) : 5.60% w/w
ઇમલ્સિફાયર B: (અલ્કાઇલ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડના કેલ્શિયમ મીઠા અને ફેટી આલ્કોહોલના પોલીઇથોનોક્સી પ્રોપોક્સી ઇથરનું મિશ્રણ) : 2.40% w/w
સુગંધિત હાઇડ્રોકાર્બન દ્રાવક (એરોમેક્સની જેમ): Q.S.%
કુલ: 100.00% w/w

આ લેબલ/માહિતી પત્રિકામાં સ્પષ્ટ કર્યા સિવાયના પાક પર ઉપયોગ કરવો જોઇએ નહીં.

கொரோலா-505™

குளோர்பைரிஃபாஸ் 50% + சைபர்மெத்ரின் 5% EC
(முறைசார் மற்றும் தொடர்பு பூச்சிக்கொல்லி)

இது ஒரு குழம்பாக்கும் செறிவூட்டி ஆகும், இதில் செயல்படும் மூலப்பொருள் குளோர்பைரிஃபாஸ் 50% w/w சைபர்மெத்ரின் 5% w/w மீதமுள்ள குழம்பாக்கிகள் மற்றும் கரைப்பான் ஆகியவை அடங்கும். பருத்தியில் பூச்சி வளாகத்தை திறம்பட கட்டுப்படுத்துகிறது. *எச்சரிக்கை: நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை கொண்டது, எனவே நீர்நிலைகள், மீன் வளர்ப்பு அல்லது மீன்பிடி பகுதிகளுக்கு அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது. தேனீக்களுக்கு நச்சுத்தன்மை கொண்டது, தேனீக்கள் மேய்ச்சல் செயல்பாடு நடக்கும் போது தெளிப்பதை தவிர்க்கவும். தயாரிப்பு பறவைகளுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மை கொண்டது, எனவே பறவை வாழிடத்தின் அருகே பயன்படுத்தவும் வேண்டாம்.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பொதுப் பெயர்	மோதல்		நீர் நீர்த்தல் (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பு மற்றும் அறுவடை இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு தெளிப்பு மீண்டும் நுழைவு (மணிநேரம்)
		AI (கிராம்)	சூத்திரம் (மிலி)			
பருத்தி	அஃபிட், த்ரிப்ஸ், ஜாஸிட், வெள்ளை ஈ, அமெரிக்கன் காய்ப்புழு, இளஞ்சிவப்பு காய்ப்புழு, புள்ளி காய்ப்புழு, புள்ளி காய்ப்புழு, புள்ளி லிடுரா	500 + 50	1.000	500-1000	15	—
அரிசி (நெல்)	தண்டு துளைப்பான், இலை மடிப்பான்	312 + 32 to 375 + 38	0.625-0.750	500-700	15	—

பயன்பாட்டு திசை: பயிரின் கட்டத்தைப் பொறுத்து நீரின் அளவை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ. தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்: நாப்சாக் தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், அழுத்த நாப்சாக் தெளிப்பான், அழுத்த நாப்சாக் பேட்டரி தெளிப்பான், மற்றும் ASPEE-HTP பவர் தெளிப்பான் ஆகியவை வெற்று கூம்பு முனையுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

பயன்பாட்டு நேரம்:

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள், காலி உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் விலங்கு தீவனம் ஆகியவற்றிலிருந்து விலகி வைக்கவும். 2. வாய், கண் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்ளாமல் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு மூடுபனியை சுவாசிக்காமல் தவிர்க்கவும். காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பிறகு மாசுபட்ட ஆடைகளையும் உடலின் பகுதிகளையும் நன்கு கழுவவும். 5. தெளிக்கும் போது புகைபிடிக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ அல்லது மெல்லவோ கூடாது. 6. கலக்கும் மற்றும் தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: தலைவலி, தலைசுற்றல், தலைசுற்றல், குமட்டல், வாந்தி, மங்கலான பார்வை, வயிற்றுப்போக்கு, வலிப்பு, அதிகப்படியான வியர்வை, கண்ணீர் மல்கல் மற்றும் உமிழ்நீர் சுரப்பு ஒவ்வாமை வெளிப்பாடு ஏற்படலாம்.

முதலுதவி: 1. விழுங்கினால், வாந்தியை தூண்டாதீர்கள் அல்லது வாய்வழி திரவத்தை கொடுக்காதீர்கள். 2. ஆடை மற்றும் தோல் மாசுபட்டிருந்தால், ஆடைகளை அகற்றி, மாசுபட்ட தோலை ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் கழுவவும். 3. கண்கள் மாசுபட்டிருந்தால், சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் ஏராளமான உப்பு/சுத்தமான தண்ணீரால் கழுவவும். 4. உள்ளிழுத்தால், நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு மாற்றவும்.

தாவர நச்சுத்தன்மை:

மருந்து: 1. நோயாளிக்கு உடனடியாக அட்ரோபினைக் கொடுத்து, 5 முதல் 10 நிமிட இடைவெளியில் 2 முதல் 4 மி.கி. அட்ரோபின் சல்பேட் கொண்ட தொடர்ச்சியான டோஸ்களுடன் முழு அட்ரோபினைசேஷனை பராமரிக்கவும். ஒரு நாளுக்கு 25 முதல் 50 மி.கி. அட்ரோபின் தேவைப்படலாம். மேலும் அட்ரோபின் நிர்வாகத்தின் தேவை அறிகுறிகளின் தொடர்ச்சியால் வழிகாட்டப்படுகிறது. உமிழ்நீரின் அளவு மருந்தளவு சரிசெய்தலுக்கு ஒரு பயனுள்ள அளவுகோல். 2. 1-2 கிராம் 2 PAM 10 மி.லி. வடிகட்டிய நீரில் கரைத்து 10-15 நிமிடங்கள் மிகவும் மெதுவாக நரம்பு வழியாக செலுத்தவும். 3. ஒவ்வாமை வெளிப்பாட்டிற்கு ஹிஸ்டமைன் எதிர்ப்பிகள் கொடுக்கப்படலாம்.

பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலனை அகற்றுதல்: 1. பூச்சிக்கொல்லி உற்பத்தியாளர்கள், சூத்திரதாரர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் பொறுப்பு, சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாடு ஏற்படாமல் தடுக்கும் வகையில் பேக்கேஜிங் அல்லது மிகுதிப் பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரங்களிலிருந்து கழுவுதல்களை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றுவது. 2. மறுபயன்பாட்டைத் தடுக்க பயன்படுத்தப்பட்ட பேக்கேஜிங் வெளியே விடப்படக் கூடாது. 3. பேக்கேஜிங் உடைக்கப்பட்டு வாழ்விடத்திலிருந்து தொலைவில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பு நிலைமைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லியை கொண்ட பேக்கேஜிங் மற்ற பொருட்கள் சேமிக்கப்பட்ட அறைகள் அல்லது அறைகளிலிருந்து தனி அறைகளாகவோ அல்லது தனி அலமாரிகளாகவோ பூட்டி சாவி போட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். 2. பூச்சிக்கொல்லியை சேமிக்கும் அறைகள் அல்லது அறைகள் நன்கு கட்டப்பட்டு, உலர்ந்து, நன்கு ஒளியூட்டப்பட்டு, காற்றோட்டமாக மற்றும் போதுமான அளவு இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

குளோர்பைரிஃபாஸ் டெக்னிகல் (குறைந்தபட்ச தூய்மை 94 சதவீதம்) :	50.00% பா/பா
சைபர்மெத்ரின் ஸ.த. (குறைந்தபட்ச தூய்மை 92 சதவீதம்) :	5.00% பா/பா
குழம்பாக்கி A (கால்சியம் உப்பு மற்றும் நோனி ஃபீனாலின் பாலி ஆக்ஸி ஈதர் கலவை) :	5.60% பா/பா
குழம்பாக்கி B (கால்சியம் உப்பு மற்றும் கொழுப்பு ஆல்கஹாலின் பாலிஎதோனாக்ஸி புரோபாக்ஸி ஈதர் கலவை) :	2.40% பா/பா
நறுமண ஹைட்ரோகார்பன் கரைப்பான் (ஏரோமெக்ஸ் போன்றது)	Q.S.%
மொத்தம்	**100% பா/பா**

இந்த லேபிள்/துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர வேறு பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தக் கூடாது.

ਕੋਰੋਲਾ-505™

ਕਲੋਰਪਾਇਰਿਫੋਸ 50% + ਸਾਇਪਰਮੇਥ੍ਰਿਨ 5% EC
(ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ক্লোরোল্লা-505™

ক্লোরপিরিফোস 50% + সৈপারমেথ্রিন 5% EC
(অণতর্ম্যাহ মরিযা সুরক্ষিত ফ্রিমসংগ্রহণী)

ইদি ঐক এমলিচ্যুয়েযাবল কন্সান্ট্রেট, ইদাংলে ক্রিযাশীল পদ্তুলাং ক্লোরপিরিফোস 50% w/w মরিযা সৈপারমেথ্রিন 5% w/w, মিশ্লিন্ন ভাগ এমলিচ্যুয়েযাবল মরিযা দ্রাবেন ঙলাযেযা. ইদ এই পলদলেই পুচুগুলন সমমাসিন্য সমঝুরবেন্ডগণ সিযংগ্রেত্রিযুনদ.জাগ্রেই: জলচর জীবুলেন্ন সিযমুগণন্ন কন্নেন নিইী ঝবরেলে, আগ্রংক্রেংগ্রি লেঁদ্রে ঙেঁযল পেন্দেযে ঙ্রাংজেন্ন সমিযেলে ঙযাগণেন্নেচন্দ্রে. ইদ জীবজেন্নেগণে সিযমুগণন্ন, ক্রাংগ্রী জীবজেন্নেগণে আগণেন্ন সিইেন্নেত্রে সমযেলে সিঙ্গেন্নে চেযগণে. ঈ ঙঙ্গ্রেত্রে এই্রগণেন্ন সঙ্গুলে অঙ্গেণ্ড সিযমুগণন্ন, ক্রাংগ্রী এই্রগণেন্ন নিইযন্ন সমিযেলে ঙযাগণেন্নেচন্দ্রে.

সিফ্রৈযংগ্রে :

পলদলেযে	কীজেযে যীযুক্ত সান্দ্রেগণেন্ন নিইে	প্রতিে মিন্দ্রেগণেন্ন মেযেন্দ্রেগণে		নিইী সান্দ্রেগণে (লীযুগ)	নিযেন্ন সিযিজেন্নে সমযে ইঁগণেন্ন মযুন্ন নিইী (লেযেগণে)	প্রতিে সিযিজেন্নে প্রত্যুন্ন প্রত্রেন্ন ঙযেযগণে নিইে (সেযগণেন্নে)
		AI (গ্রাম)	সান্দ্রেগণেন্ন ইংরেজ (মিলি)			
সন্দ্রে	সিযন্ন ঙলাং, ঙমাযন্ন পুচুগুলন, রসন সিইী, ঙলেন্দ্রেগণে সিইী, ঙলেন্দ্রেগণে ঙ্রেগণেন্ন, ঙলেন্দ্রেগণে ঙ্রেগণেন্ন, ঙলেন্দ্রেগণে ঙ্রেগণেন্ন, ঙলেন্দ্রেগণে ঙ্রেগণেন্ন, সেন্দ্রেগণে ঙ্রেগণেন্ন	500 + 50	1.000	500-1000	15	—
সন্দ্রে (লযু)	ঙলাংযে ঙ্রেগণেন্ন পুচুগুলন, ঙযন্ন মযুন্ন	312 + 32 ঙ 375 + 38	0.625-0.750	500-700	15	—

উপযোগিগণেত্রে বিদ্রেনসন: ঙলাং দঙযন্ন ঙযুন্ন নিইী সিযিমাংজন্নযু সিংলেগণে লেঁদ্রে ঙ্রীগণেন্নেচন্দ্রে. মিযুক্ত রক্ষেন্ন সিযিইযেলন: সন্নসিসন্নে স্যিুযেলে, ফুযেন্ট স্যিুযেলে, ক্রেঙ্গেসন্নে সন্নসিসন্নে স্যিুযেলে, ক্রেঙ্গেসন্নে সন্নসিসন্নে স্যিুযেলে, ক্রেঙ্গেসন্নে সন্নসিসন্নে নিইী স্যিুযেলে, ক্রেঙ্গেসন্নে সন্নসিসন্নে নিইী স্যিুযেলে মরিযা ঙযেযগণে নিইী স্যিুযেলে, ঙলেন্দ্রেগণে সিইযন্ন সন্নসিসন্নে নিইী স্যিুযেলে মরিযা ঙযেযগণে নিইী স্যিুযেলে ASPEE-HTP সিযিইী স্যিুযেলে.

প্রযোগনিগণ সমযযন:

জান্রেগুলে: 1. ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন, ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন পান্ত্রেগণে মরিযা ঙলাংযন্ন ঙযেযগণে নিইে দুযেগণেন্ন ঙলেন্দ্রে. 2. সেযগণে, ঙলেন্দ্রে মরিযা চন্দ্রগণে নিইে সংলগ্নেযন্ন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 3. সিযিজেন্নেযন্নে ঙলেন্দ্রে ঙযন্নেন্নে সিইযন্নেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. নেঙযেন্নে সিইযন্নেন্নে নিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 4. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে ঙযন্নেন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 5. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে ঙযন্নেন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 6. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে ঙযন্নেন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 7. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে ঙযন্নেন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 8. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে ঙযন্নেন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 9. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে ঙযন্নেন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 10. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে ঙযন্নেন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 11. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে ঙযন্নেন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 12. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে ঙযন্নেন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে.

অন্যগুলেযন্ন সমযযন:

মেযন্নুন্নুন্নিইেগণেন্ন: 1. ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন, ঙযেযগণে ঙযেযগণে সন্নসিসন্নে মরিযা সন্নন্নেগণেন্ন ঙযেযগণেন্নে ঙলেন্দ্রেন্নে. 2. ঙযেযগণে, ঙযেযগণে মরিযা ঙযেযগণে সন্নসিসন্নে. 3. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে, ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 4. ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 5. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 6. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 7. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 8. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 9. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 10. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 11. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 12. সিযিজেন্নেযন্নে ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে.

প্রযুক্তযা মেযন্নুন্নুন্নিইেগণেন্ন: 1. সেযগণে সিযন্নগুলেন, সেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 2. সেযগণে, সেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 3. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 4. সেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 5. সেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 6. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 7. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 8. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 9. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 10. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 11. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 12. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে.

সন্ত্রে নিইযন্ন:

নিযে সিযন্নগুলে: 1. মেযেগিই সন্ত্রেন্ন অন্ত্রেন্নেসন্ন সিইী মরিযা ঙ্রে 5 ঙ্রিযে 10 সিযিজেন্নেযন্নে অংসেযেন্নে 2 ঙিযে 4 মিযান্ত্রেন অন্ত্রেন্নেসন্ন সন্ত্রেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 3. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 4. ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 5. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 6. ঙযেযগণে সিযন্নগুলেন সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 7. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 8. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 9. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 10. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 11. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 12. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে.

ঙ্রেন্নেযন্ন নিইযন্ন: 1. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 2. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 3. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 4. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 5. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 6. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 7. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 8. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 9. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 10. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 11. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে. 12. সিযিজেন্নেযন্নে সিইযন্নেন্নে ঙলেন্দ্রে.

**ঙ্রেন্নেযন্ন সিইযন্নেন্নে