

COMPORTAMIENTO

Poco antes del parto, la yegua se mostrará inquieta, podría patear el suelo, levantar la cola, mirarse repetidamente a los costados (como en los síntomas del cólico) y sudar profusamente, incluso aunque no haga calor. Las micciones y las excreciones pequeñas frecuentes también pueden indicar un parto inminente.

BARRIGA

Al cabo de unos seis meses, empezará a verse que la yegua está preñada. Es posible que a las yeguas que ya han parido con anterioridad se les vea el vientre abultado antes que a las yeguas primerizas. Durante los meses restantes, el abdomen de la yegua seguirá creciendo conforme se vaya acercando la fecha del parto. Cuando el potro se posicione para el parto, el vientre se verá más bajo. A veces, se pueden ver o sentir los movimientos del potro.



Preñada y no preñada.

LIGAMENTOS PÉLVICOS

Los músculos que rodean la base de la cola se relajarán. A medida que los músculos de la cadera y la zona glútea comiencen a relajarse, se formará un hueco a ambos lados de la raíz de la cola. Esto hará que la cola parezca un poco más alta de lo normal. Puede ocurrir de 2 a 3 semanas antes del parto, pero también justo antes del parto o no ocurrir en absoluto.



Preñada y no preñada.

La yegua gestante y el parto

INTRODUCCIÓN

Las yeguas que hayan completado el 90 % o más de su gestación prevista no se consideran aptas para el transporte. El tiempo de gestación de las yeguas puede variar mucho: la media es de 335 días, pero puede oscilar entre 320 y 360 días. Si se conoce el momento de la inseminación, se puede calcular el momento previsto del parto. Si no se conoce el momento de la inseminación, se pueden tener en cuenta ciertos signos para determinar que la yegua está al final de la gestación que el potro nacerá pronto.



VULVA


Justo antes del parto, se relaja toda la zona trasera, incluida la vulva. Parecerá más larga y no tendrá tantas arrugas alrededor.



Preñada, preñada y no preñada.

ALTURA DE LA COLA


Cuanto más cerca esté la yegua del parto, menos resistencia mostrará cuando se le levanta la cola, o incluso es posible que no muestre ninguna resistencia.



Preñada y no preñada.

UBRE

Cuando la yegua está a punto de parir, la ubre se congestiona y se pone muy tensa. Entre tres y seis semanas antes de la fecha del parto, la ubre comenzará a distendirse. Unos días antes del parto, se podrá observar una secreción de calostro que al secarse forma una especie de cera o gotitas de leche en las puntas de los pezones. Se conoce como “encerado” y es un signo de que la yegua está muy cerca del parto. Desgraciadamente, no es un indicador infalible, ya que algunas yeguas no desarrollan este encerado. Justo antes del parto, la ubre suele empezar a gotear leche, e incluso a veces puede producirse un chorro de leche constante.



Preñada y no preñada.

