

GALICIA · PAU 2019 · EXTRAORDINARIA

Matemáticas II

8 ejercicios

Instrucciones del examen

El/La estudiante debe responder solamente las preguntas de una de las opciones. La puntuación máxima por preguntas es la siguiente: 1.ª pregunta: 2 puntos; 2.ª pregunta: 3 puntos; 3.ª pregunta: 3 puntos; 4.ª pregunta: 2 puntos.

Ejercicio 1

OPCIÓN A 2 puntos

Da respuesta a los apartados siguientes:

a) puntos

Despeja X en la ecuación $XA + B = C$, sabiendo que A es una matriz invertible.

b) puntos

Calcula X tal que $XA + B = C$ si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 1

OPCIÓN B 2 puntos

Da respuesta a los apartados siguientes:

a) puntos

Discute, según los valores del parámetro m , el siguiente sistema:
$$\begin{cases} x - y + 3z = m \\ my - 2z = -2 \\ x + (m - 1)y + (m + 3)z = m \end{cases}$$

b) puntos

Resuélvelo, si es posible, en los casos $m = 0$ y $m = 2$.

Ejercicio 2

OPCIÓN A 3 puntos

Da respuesta a los apartados siguientes:

a) puntos

Estudia los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos relativos de la función $f(x) = x^2 \ln x$.

b) puntos

Considérese un triángulo tal que: dos de sus vértices son el origen $O(0,0)$ y el punto $P(1,3)$, uno de sus lados está sobre el eje X y otro sobre la tangente en $P(1,3)$ a la gráfica de la parábola $y = 4 - x^2$. Se pide calcular las coordenadas del tercer vértice, dibujar el triángulo y calcular, por separado, el área de las dos regiones en las que el triángulo queda dividido por la parábola $y = 4 - x^2$.

Ejercicio 2

OPCIÓN B 3 puntos

Da respuesta a los apartados siguientes:

a) puntos

De entre todos los triángulos rectángulos contenidos en el primer cuadrante que tienen un vértice en el origen, otro sobre la parábola $y = 4 - x^2$, un cateto sobre el eje X y el otro paralelo al eje Y , obtén los catetos y la hipotenusa de aquel cuya área es máxima.

b) puntos

Enuncia los teoremas de Bolzano y de Rolle.

Ejercicio 3

OPCIÓN A 3 puntos

Se pide:

a) puntos

Estudiar la posición relativa de los planos $\pi_1 : x + my + z + 2 = 0$ y $\pi_2 : mx + y + z + m = 0$ en función de m .

b) puntos

Calcular el valor que deben tomar a y b para que los puntos $A(0, a, 1)$, $B(-1, 2, 1)$ y $C(8, 1, b)$ estén alineados.

c) puntos

Obtener las ecuaciones paramétricas de la recta r que pasa por los puntos $P(-1, 2, 1)$ y $Q(8, 1, 1)$; y la ecuación implícita del plano perpendicular a r que pasa por el punto $R(1, 1, 1)$.

Ejercicio 3

OPCIÓN B 3 puntos

Se pide:

a) puntos

Para el plano $\pi : 3x + 2y - z = 0$ y la recta $r : \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{3}$, calcular el punto de corte de r con π y obtener la ecuación implícita del plano π^* que es perpendicular a π y contiene a r .

b) puntos

Estudiar la posición relativa de los planos $\pi_1 : 2x - 5y - 4z - 9 = 0$ y $\pi_2 : x = 0$, y calcular el ángulo $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ]$ que forman.

Ejercicio 4

OPCIÓN A 2 puntos

Da respuesta a los apartados siguientes:

a) puntos

La probabilidad de que un chico recuerde regar su rosal durante una cierta semana es de $\frac{2}{3}$. Si se riega, el rosal sobrevive con probabilidad 0,7; si no, lo hace con probabilidad 0,2. Al finalizar la semana, el rosal ha sobrevivido. ¿Cuál es la probabilidad de que el chico no lo haya regado?

b) puntos

Una fábrica produce piezas cuyo grosor sigue una distribución normal de media 8 cm y desviación típica 0,01 cm. Calcula la probabilidad de que una pieza tenga un grosor comprendido entre 7,98 y 8,02 cm.

Da respuesta a los apartados siguientes:

a) puntos

Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral tales que $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,4$ y $P(A \cup B) = 0,5$.
Calcula $P(\bar{A})$, $P(\bar{B})$, $P(A \cap B)$ y $P(\bar{A} \cup \bar{B})$. Razona si A y B son o no sucesos independientes.

b) puntos

La probabilidad de que un determinado jugador de fútbol marque gol desde el punto de penalti es $p = 0,7$. Si lanza 5 penaltis, calcula las siguientes tres probabilidades: de que no marque ningún gol; de que marque por lo menos 2 goles; y de que marque 5 goles. Si lanza 2100 penaltis, calcula la probabilidad de que marque por lo menos 1450 goles. Se está asumiendo que los lanzamientos son sucesos independientes.

Tu Profe al Rescate