

ASTURIAS · PAU 2016 · ORDINARIA · 1

Química

10 ejercicios

Instrucciones del examen

Ejercicio 1

OPCIÓN A 2,5 puntos

La trinitroglicerina, $C_3H_5N_3O_9$, conocida comúnmente como nitroglicerina, es un líquido que se utiliza como explosivo. La entalpía estándar de descomposición de la trinitroglicerina, para formar nitrógeno gas, dióxido de carbono gas, oxígeno gas y agua líquida, es $-1541,4 \text{ kJ/mol}$ de trinitroglicerina.

i) 1,25 puntos

Escriba la ecuación química ajustada para la descomposición de la trinitroglicerina y calcule el volumen que ocuparán los gases resultantes de la descomposición de 1 mol de trinitroglicerina líquida a 1 atm y 25°C .

ii) 1,25 puntos

Calcule la entalpía estándar de formación de la trinitroglicerina.

Ejercicio 1

OPCIÓN B 2,5 puntos

En un matraz de 5,0 L, en el que inicialmente se ha realizado el vacío, se introducen 0,1 moles de cada uno de los siguientes gases: $CH_4(g)$, $H_2O(g)$, $CO_2(g)$ e $H_2(g)$. Se eleva la temperatura del recipiente hasta 1000 K, alcanzándose el equilibrio:



i) 1 punto

Justifique si la mezcla gaseosa inicial se encuentra en equilibrio, o no, a 1000 K, y el sentido en el que evolucionará el sistema para alcanzar el equilibrio.

ii) 1,5 puntos

Si la presión total de la mezcla gaseosa en el equilibrio a 1000 K es de 7 atm, calcule su composición, en moles de cada gas.

Ejercicio 2

OPCIÓN A 2,5 puntos

En el laboratorio se obtienen pequeñas cantidades de cloro gas adicionando gota a gota una disolución acuosa de ácido clorhídrico, $HCl(ac)$, sobre cristales de permanganato de potasio, $KMnO_4(s)$. En la reacción también se obtiene $Mn^{2+}(ac)$:

i) 1,75 puntos

Escriba y ajuste, por el método del ión-electrón, en forma iónica y molecular, la reacción química que tiene lugar. Indique la especie que actúa como reductor.

ii) 0,75 puntos

Calcule la mínima cantidad, en gramos, de permanganato de potasio necesaria para obtener 1 L de cloro gas a 25°C y 1 atm. Suponga que el rendimiento de la reacción es del 100%.

Ejercicio 2

OPCIÓN B 2,5 puntos

Se mezclan 25,0 mL de una disolución acuosa de ácido nítrico, $\text{HNO}_3(\text{ac})$, de $\text{pH} = 2,12$, con 25,0 mL de una disolución acuosa de hidróxido de potasio, $\text{KOH}(\text{ac})$, de $\text{pH} = 12,6$. Calcule el pH de la disolución acuosa resultante. Suponga que los volúmenes son aditivos.

Ejercicio 3

OPCIÓN A 1 puntos

Un tubo de ensayo contiene 5 mL de una disolución acuosa de nitrato de plata, AgNO_3 , a la que se añade, gota a gota, una disolución acuosa de cloruro de sodio, NaCl , hasta la formación de un precipitado claramente visible. Escriba la fórmula química del compuesto que precipita. ¿Qué reactivo utilizaría para disolver el precipitado formado? Justifique la respuesta.

Ejercicio 3

OPCIÓN B 1 puntos

En dos tubos de ensayo se colocan unos cristales de permanganato de potasio, $\text{KMnO}_4(\text{s})$. En el tubo 1 se añaden 5 mL de agua y en el tubo 2 se añaden 5 mL de un disolvente orgánico no polar. Indique y justifique las observaciones realizadas en cada uno de los tubos de ensayo.

Ejercicio 4

OPCIÓN A 2 puntos

a) 1 punto

Escriba las configuraciones electrónicas de los elementos X ($Z = 16$) e Y ($Z = 52$). Indique el grupo y período al que pertenece cada uno de los elementos. Indique, de forma razonada, el elemento que presenta el valor más elevado del radio atómico.

b) 1 punto

Deduzca, de forma razonada, el carácter polar, o no polar, de la molécula BeCl_2 .

Ejercicio 4

OPCIÓN B 2 puntos

a) 1 punto

Indique, de forma razonada, el número máximo de electrones desapareados que presentan los siguientes átomos: i) Co ($Z = 27$); ii) Zr ($Z = 40$).

b) 1 punto

Para una determinada reacción química $\Delta H = 17,8 \text{ kJ}$ y $\Delta S = 123 \text{ J K}^{-1}$. Calcule la temperatura a partir de la cual la reacción será espontánea.

Ejercicio 5

OPCIÓN A 2 puntos

a) 1 punto

Para preparar una disolución acuosa básica utilizaría como soluto: i) $\text{NaCH}_3\text{COO}(\text{s})$; ii) $\text{NaCl}(\text{s})$; iii) $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$. Justifique la respuesta.

b) 1 punto

Nombre y escriba las fórmulas semidesarrolladas de los compuestos orgánicos obtenidos en la adición de agua a 1-buteno ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$).

Ejercicio 5

OPCIÓN B 2 puntos

a) 1 punto

La pila voltaica representada por el esquema: $\text{Cd(s)} \mid \text{Cd}^{2+}(\text{ac}, 1\text{M}) \parallel \text{Cu}^{2+}(\text{ac}, 1\text{M}) \mid \text{Cu(s)}$, tiene un potencial estándar de pila de 0,743 V. Escriba la ecuación química que representa la reacción que tiene lugar en el ánodo y calcule el potencial estándar de reducción del electrodo Cd^{2+}/Cd .

b) 1 punto

Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos: i) 1,1,1-clorodifluoroetano ii) 2-cloro-3-metil-2-penteno iii) Butanal iv) Dietilmetilamina

Tu Profe al Rescate