

ASTURIAS · PAU 2023 · EXTRAORDINARIA

Física

10 ejercicios · 90 min de duración

Instrucciones del examen

Responda en el pliego del examen a un máximo de cinco preguntas cualesquiera de entre las diez que se proponen. Todas las preguntas se calificarán con un máximo de 2 puntos. Indique en el pliego del examen la agrupación de preguntas que responderá: agrupaciones de preguntas que sumen más de 10 puntos conllevarán la anulación de la(s) última(s) pregunta(s) seleccionada(s) y/o respondida(s).

Ejercicio 1

2 puntos

La Agencia Espacial Europea (ESA) pretende poner un satélite de 100 kg de masa en una órbita circular a 150 km de altura alrededor de la Tierra.

a) 1 punto

Obtenga la velocidad inicial mínima necesaria para que el satélite alcance dicha altura.

b) 1 punto

Una vez alcanzada esa altura, calcule la energía cinética que habría que proporcionarle al satélite para que se mantenga realizando una órbita circular alrededor de la Tierra.

Ejercicio 2

2 puntos

Una sonda espacial se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 25 km/s desde la superficie de un planeta de masa $M_P = 3,25 \times 10^{25}$ kg y con radio $R_P = 5,75 \times 10^6$ m.

a) 1 punto

Responda de forma justificada: ¿conseguirá escapar la sonda espacial de la atracción gravitatoria del planeta?

b) 1 punto

Determine el peso de la sonda en el instante del lanzamiento si la energía cinética que se le comunica es de 2×10^{12} J.

Ejercicio 3

2 puntos

Dos cargas eléctricas iguales y con el mismo signo, se encuentran situadas en los puntos del plano XY de coordenadas (2, 2) m y (-2, -2) m, respectivamente. El campo eléctrico generado por ambas cargas en el punto (1, 1) m tiene un módulo $E = 8,1 \times 10^4$ N·C⁻¹.

a) 1 punto

Calcule el valor de las cargas eléctricas y el vector campo eléctrico en el punto (-1, -1) m.

b) 0,5 puntos

Calcule el trabajo para llevar una carga de 5 nC desde el infinito hasta el punto (-1, -1) m.

c) 0,5 puntos

Indique el signo que debe tener la carga eléctrica si el trabajo para trasladarla hasta dicho punto desde el infinito, lo realiza la fuerza del campo eléctrico.

Ejercicio 4

2 puntos

Dos hilos conductores rectilíneos de longitud indefinida y paralelos entre sí, que se hallan separados una distancia $d = 0,4 \text{ m}$, transportan sendas intensidades de corriente $I_1 = 1 \text{ A}$ e $I_2 = 3 \text{ I}_1$, circulando ambas en el mismo sentido. Determine, en los puntos del plano definido por ambos conductores:

a) 1 punto

El vector campo magnético B generado por los dos hilos conductores en el punto intermedio entre ambos, a la distancia $d/2$ de cada uno de ellos.

b) 1 punto

Los puntos en los que se anula el campo magnético B resultante.

Ejercicio 5

2 puntos

Una onda armónica transversal de frecuencia $f = 0,25 \text{ Hz}$, longitud de onda $\lambda = 2 \text{ m}$ y amplitud de vibración de $0,5 \text{ m}$, se propaga en el sentido positivo del eje X . Si en el punto $x = 0$ se cumple que en el instante inicial $t = 0$ s, la elongación de la onda es máxima, determine:

a) 0,5 puntos

La velocidad de propagación y el número de ondas.

b) 1 punto

La función que representa dicha onda.

c) 0,5 puntos

La velocidad máxima de oscilación de cualquier punto alcanzado por la onda.

Ejercicio 6

2 puntos

Dos altavoces que se encuentran separados una distancia de 8 m emiten sonido con sendas potencias de 100 W y 120 W , respectivamente.

a) 1 punto

Determine el nivel de intensidad sonora total que mide un técnico de sonido con un sonómetro en un punto situado a mitad de distancia entre ambos altavoces.

b) 1 punto

¿En qué puntos de la línea que une ambos altavoces se mediría la misma sonoridad para cada altavoz?

Ejercicio 7

2 puntos

Un objeto de altura y se coloca a una distancia igual a $3f$ del centro de una lente convergente que tiene una distancia focal f .

a) 1 punto

Realice un diagrama de rayos para obtener la imagen a escala que se forma del objeto.

b) 1 punto

Justifique analíticamente si la imagen que se obtiene es real o virtual, derecha o invertida y de mayor o menor tamaño que el objeto.

Ejercicio 8

2 puntos

Un rayo de luz monocromática incide desde el aire con un ángulo $\phi_i = 45^\circ$ sobre una de las caras de un prisma triangular de material transparente, cuyas superficies planas forman un ángulo de 60° . Si el índice de refracción del material para esa radiación monocromática es $n_{\text{material}} = 1,45$, determine:

a) 1 punto

El ángulo de refracción en la primera superficie.

b) 1 punto

El menor valor posible del ángulo de incidencia sobre la segunda superficie para que un rayo que viaja por el interior del prisma pueda emerger a través de ella hacia el aire.

Ejercicio 9

2 puntos

Se determina experimentalmente el trabajo de extracción de cierto material obteniendo un valor de 2,1 eV.

a) 1 punto

Indique cuál de las siguientes radiaciones producirá efecto fotoeléctrico si se irradia una lámina de dicho material con luz infrarroja de longitud de onda $\lambda = 780 \text{ nm}$, o luz ultravioleta de $\lambda = 280 \text{ nm}$.

b) 0,5 puntos

Calcule la energía cinética máxima de los electrones emitidos en el caso anterior.

c) 0,5 puntos

Obtenga el potencial de frenado requerido para detener los fotoelectrones emitidos.

Ejercicio 10

2 puntos

La energía de la luz emitida por un láser, correspondiente a la radiación de la transición electrónica entre los niveles del primer estado excitado y el nivel fundamental de una especie atómica, es de 2,17 eV. Sin embargo, el proceso de absorción en dicha sustancia se debe a la transición entre el nivel fundamental y el segundo estado excitado, cuya energía es de 2,85 eV. Calcule:

a) 1 punto

La longitud de onda de la radiación emitida.

b) 1 punto

La longitud de onda y la frecuencia del fotón necesario para la transición electrónica del proceso de absorción.