

ASTURIAS · PAU 2019 · ORDINARIA

Química

10 ejercicios

Instrucciones del examen

Ejercicio 1

OPCIÓN A 2,5 puntos

Dibuje el ciclo de Born-Haber y calcule la energía de red (ΔH_{red}) del KI(s) a partir de los siguientes datos:

Ejercicio 1

OPCIÓN B 2,5 puntos

Se mezclan 7,5 mL de una disolución acuosa de ácido nítrico, HNO_3 , de $\text{pH} = 1,5$, con 2,5 mL de una disolución acuosa de ácido clorhídrico, HCl , del 0,8% en masa y densidad igual a $1,05 \text{ g mL}^{-1}$. La mezcla se diluye con agua hasta un volumen final de la disolución de 2 L. Calcule el pH de la disolución resultante.

Ejercicio 2

OPCIÓN A 2,5 puntos

Experimentalmente se determinó que en 250 mL de una disolución acuosa saturada de carbonato de calcio, CaCO_3 , a 25°C , hay 1,3 mg de sal disueltos.

i) 2 puntos

Calcule el valor de la constante del producto de solubilidad del CaCO_3 en agua a 25°C .

ii) 0,5 puntos

Calcule la concentración máxima de Ca^{2+} que puede estar disuelto en una disolución acuosa que presenta una $[\text{CO}_3^{2-}] = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ M}$, a 25°C .

Ejercicio 2

OPCIÓN B 2,5 puntos

Cuando se añade una disolución acuosa de peróxido de hidrógeno, H_2O_2 , a una disolución acuosa ácida que contiene bromo disuelto, $\text{Br}_2(\text{ac})$, se produce una reacción química espontánea. A partir de los valores de los potenciales estándar de reducción, $E^0(\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = +1,763 \text{ V}$ y $E^0(\text{BrO}_3^-/\text{Br}_2) = +1,478 \text{ V}$:

i) 2 puntos

Indique, de forma razonada, la especie química en disolución que experimenta la reacción de oxidación y la que experimenta la reacción de reducción. Escriba y ajuste por el método del ion-electrón la ecuación que representa la reacción química que se produce de forma espontánea. Indique la especie química que actúa como reductor.

ii) 0,5 puntos

Calcule el potencial estándar de la reacción global.

Ejercicio 3

OPCIÓN A 1 puntos

Describa el procedimiento experimental a seguir en el laboratorio para determinar la concentración de peróxido de hidrógeno en un agua oxigenada, mediante la valoración denominada permanganimetría. Indique el material de laboratorio utilizado.

Ejercicio 3

OPCIÓN B 1 puntos

Para la valoración de una base fuerte, $\text{NaOH}(\text{ac})$, con un ácido fuerte, $\text{HCl}(\text{ac})$, proponga, de forma razonada, el indicador que utilizaría para identificar el punto de equivalencia y el cambio de color que observaría. Indique el material de laboratorio en el que colocaría el indicador utilizado.

Ejercicio 4


OPCIÓN A 2 puntos

a) 1 punto

Indique, de forma razonada, el carácter ácido, básico o neutro de la disolución acuosa resultante de la neutralización exacta de una disolución acuosa de hidróxido de sodio, NaOH , con una disolución acuosa de ácido nitroso, HNO_2 .

b) 1 punto

Ajuste, por el método del ion-electrón en medio básico, la siguiente ecuación química:



Ejercicio 4

OPCIÓN B 2 puntos

a) 1 punto

Los siguientes diagramas de orbitales corresponden a especies químicas neutras. Indique los diagramas que son correctos, los que son incorrectos y los que corresponden a estados fundamentales o excitados del átomo neutro. Justifique todas las respuestas.

b) 1 punto

Escriba las configuraciones electrónicas, en estado fundamental, de los elementos X ($Z=17$) e Y ($Z=35$). Indique el grupo y periodo de la tabla periódica a los que pertenece cada uno de los elementos. A partir de su posición en la tabla periódica, indique, de forma razonada, el elemento que previsiblemente presentará el valor más elevado de la primera energía de ionización.

Ejercicio 5

OPCIÓN A 2 puntos

a) 0,5 puntos

Para la reacción química elemental $\text{A} \longrightarrow \text{B}$, dibuje: i) un perfil energético; ii) un perfil energético en presencia de un catalizador positivo.

b) 1,5 puntos

Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos: i. Ácido 3-bromohexanoico ii. 2-butino (but-2-ino) iii. 4-hidroxipentanal iv. Butanodiona v. Fenilmetilamina vi. Acetato de propilo

Ejercicio 5

OPCIÓN B 2 puntos

a) 0,5 puntos

Deduzca, a partir de su estructura molecular, el carácter polar, o no polar, de la molécula CH_2O , que presenta una geometría molecular triangular.

b) 1,5 puntos

Escriba las fórmulas semidesarrolladas y nombre tres de los isómeros posibles del ácido carboxílico con fórmula molecular $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$.

Tu Profe al Rescate