

EXTREMADURA · PAU 2018 · ORDINARIA

Química

10 ejercicios

Instrucciones del examen

Ejercicio 1

OPCIÓN A 2,5 puntos

Escribir la configuración electrónica de las siguientes especies: F^- , Ar , K^+ , Ca^{2+} y Fe^{2+} .

a) 1 punto

Escribir la configuración electrónica de las especies mencionadas.

b) 1 punto

Razonar las especies que tienen electrones desapareados.

c) 0,5 puntos

Razonar cuáles de las anteriores especies son isoelectrónicas.

Ejercicio 1

OPCIÓN B 2,5 puntos

Responda a las siguientes cuestiones sobre geometría molecular y enlaces.

a) 1,6 puntos

Mediante la teoría de RPECV, explicar la geometría de las siguientes moléculas indicando la hibridación que presentan: 1) CCl_4 ; 2) BF_3 ; 3) $HC\equiv CH$; 4) H_2O .

b) 0,9 puntos

Razonar cuál de las especies anteriores posee enlaces por puente de hidrógeno.

Ejercicio 2

OPCIÓN A 2 puntos

Dada la reacción $A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$, explicar razonando la respuesta en qué sentido se desplazará la reacción si, en un reactor de 2 L, hay 2,5 mol de A y 3 mol de B en un momento dado, a 300 K.

a) 1 punto

Indicar en qué sentido se desplazará la reacción si se aumenta la concentración de B.

b) 1 punto

Razonar si la reacción es exotérmica o endotérmica.

Ejercicio 2

OPCIÓN B 2 puntos

En un matraz vacío de 1 L de capacidad se colocan 6 g de PCl_5 gaseoso. Se calienta a 250°C , con lo que el PCl_5 se disocia parcialmente en Cl_2 y PCl_3 , ambos gaseosos:



La presión de equilibrio es 2,078 atm.

a) 1 punto

Calcular el grado de disociación del PCl_5 .

b) 1 punto

Calcular la constante de equilibrio K_p a 250°C .

Ejercicio 3

OPCIÓN A 2 puntos

Una disolución acuosa de un ácido monoprótico de concentración $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ tiene un pH de 1,5.

a) 1 punto

Calcular su constante de disociación.

b) 1 punto

¿Qué concentración debería tener la disolución para que el pH fuera 2?

Ejercicio 3

OPCIÓN B 2 puntos

En un recipiente conteniendo una disolución azulada 1 M de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ se introduce una lámina de aluminio. Se observa que mientras la disolución se va decolorando, en la lámina aparece un depósito amarillento.

a) 1 punto

Escribir las semirreacciones de oxidación y reducción que se producen en el recipiente, indicando cuál es el ánodo y el cátodo.

b) 1 punto

Proponer el esquema de una pila cuya reacción redox sea igual a la del proceso anterior y calcular el potencial normal de la pila.

Ejercicio 4

OPCIÓN A 2 puntos

Para la reacción $\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C}$ se han obtenido los siguientes resultados a temperatura constante:

a) 1 punto

Considerando que la ecuación de velocidad es $v = k[\text{A}]^\alpha[\text{B}]^\beta$, determinar los valores de α y β e indicar cuál es el orden global de reacción.

b) 1 punto

Determinar la constante de velocidad con sus unidades.

Ejercicio 4

OPCIÓN B 2 puntos

Se sabe que, a cierta temperatura, la solubilidad del PbI_2 en agua pura es $0,65 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$.

a) 1 punto

Determinar la constante del producto de solubilidad.

b) 1 punto

Determinar la solubilidad (en $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$) de PbI_2 en presencia de una disolución $0,15 \text{ M}$ de KI , a la misma temperatura.

Ejercicio 5

OPCIÓN A 1,5 puntos

Justificar las diferencias que se producen en las reacciones del butan-1-ol con un oxidante fuerte (como KMnO_4) y con oxígeno (O_2).

a) 1 punto

Justificar las diferencias en las reacciones.

b) 0,5 puntos

Nombrar los dos tipos de reacción y los productos de cada una.

Ejercicio 5

OPCIÓN B 1,5 puntos

Formular y nombrar:

a) 0,5 puntos

Un isómero de función del butan-1-ol.

b) 0,5 puntos

Un isómero de posición del but-1-eno.

c) 0,5 puntos

Un isómero de cadena del butano.