

CANARIAS · PAU 2020 · EXTRAORDINARIA

Matemáticas II

8 ejercicios · 90 min de duración

Instrucciones del examen

Configure su examen con cuatro preguntas seleccionadas libremente de los grupos A o B. En caso de presentar más de cuatro preguntas, sólo se corregirán las cuatro primeras. En el desarrollo de cada pregunta, detalle y explique los procedimientos empleados para solucionarla. Se califica todo el proceso. Se puede utilizar cualquier calculadora científica no programable ni con conexión a Internet.

Ejercicio 1

OPCIÓN A 2,5 puntos

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) 1,25 puntos

Calcule: $\int_0^{\pi/2} x \operatorname{sen} x \, dx$

b) 1,25 puntos

Halle las asíntotas de la función: $f(x) = \frac{x^3 + 5x^2}{x^2 - 1}$

Ejercicio 1

OPCIÓN B 2,5 puntos

Halle los valores de a y b para que la recta de ecuación $y = 6x + a$ sea tangente a la curva $f(x) = \frac{bx-1}{bx+1}$ en el punto de abscisa $x = 0$. Escriba las funciones que se obtienen.

Ejercicio 2

OPCIÓN A 2,5 puntos

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 9 \\ 10 & -3 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 9 \\ 10 & -3 & 4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -3 & -1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Se plantea la siguiente ecuación matricial: $X \cdot A - C^t = X \cdot B$

a) 0,5 puntos

Justifique razonadamente cuál es la dimensión de la matriz X .

b) 2 puntos

Halle la matriz X que cumple la ecuación.

Ejercicio 2

OPCIÓN B 2,5 puntos

Sea el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} kx + 2y + 6z = 0 \\ 2x + ky + 4z = 2 \\ 2x + ky + 6z = k - 2 \end{cases}$$

a) 1,75 puntos

Discuta el sistema según los valores del parámetro k .

b) 0,75 puntos

Resuelva el sistema para $k = 0$.

Ejercicio 3

OPCIÓN A 2,5 puntos

Dada la recta $r : \begin{cases} x = -2\lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases}$, y dado el plano $\pi \equiv x - 3y + 5z = 2$

a) 1,25 puntos

¿Cuál es la posición relativa de la recta r y el plano π ?

b) 1,25 puntos

Calcular el plano π' que contiene a la recta r y es perpendicular al plano π .

Ejercicio 3

OPCIÓN B 2,5 puntos

Consideremos el punto $P(1, 2, 1)$, y la recta $r : \begin{cases} x + y = 5 \\ 3y + z = 14 \end{cases}$

a) 1,5 puntos

Encuentre la ecuación del plano π que contiene al punto P y es perpendicular a la recta r .

b) 1 punto

Consideremos $Q(1, 4, 2)$, un punto de la recta r . Y sea s la recta determinada por los puntos P y Q . Calcule el ángulo que forman las rectas r y s .

Ejercicio 4

OPCIÓN A 2,5 puntos

Si una bombilla fluorescente presenta un 90% de posibilidades de tener una vida útil de al menos 800 horas, seleccionando 20 bombillas fluorescentes de este tipo, justificar si las siguientes afirmaciones son ciertas:

a) 1 punto

Al seleccionar exactamente 18 bombillas fluorescentes, más del 30% tienen una vida útil de al menos 800 horas.

b) 1 punto

La probabilidad de que dos bombillas fluorescentes o menos NO tengan una duración de al menos 800 horas es menor que 0,7.

c) 0,5 puntos

El valor esperado de bombillas con una vida útil de al menos 800 horas si se toma una muestra de 100 bombillas fluorescentes es igual a 10.

Ejercicio 4

OPCIÓN B 2,5 puntos

Mi despertador no funciona muy bien, pues el 20% de las veces no suena. Cuando suena, llego tarde a clase el 20% de las veces; pero si no suena, la probabilidad de que llegue tarde es 0,9.

a) 0,5 puntos

Represente el diagrama de árbol del problema.

b) 0,75 puntos

Justifique si el porcentaje de veces que llego tarde a clase y ha sonado el despertador es mayor que el 20%.

c) 0,75 puntos

Justifique si la probabilidad de que no llegue tarde a clase es menor que 0,5.

d) 0,5 puntos

Si un día llego tarde a clase, ¿cuál es la probabilidad de que haya sonado el despertador?

Tu Profe al Rescate