

# Proves d'accés a la universitat

Convocatòria 2015

## Física


### Sèrie 5

L'examen consta d'una part comuna (problemes P1 i P2), que heu de fer obligatòriament, i d'una part optativa, de la qual heu d'escollir UNA de les dues opcions (A o B) i fer els problemes P3, P4 i P5 corresponents.

Cada problema val 2 punts.

#### PART COMUNA


P1) El 1877, l'astrònom Asaph Hall va descobrir els satèl·lits del planeta Mart: Fobos i Deimos. El dia 6 d'agost de 2012, el robot *Curiosity* va arribar al planeta Mart i des de llavors envia informació a la Terra sobre les característiques d'aquest planeta. A partir de les dades subministrades, calculeu:



- La massa del planeta Mart.
- El radi de l'òrbita de Deimos i la velocitat d'escapament del robot *Curiosity* des de la superfície del planeta.

DADES: Radi de Mart,  $R_{\text{Mart}} = 3\,390 \text{ km}$   
Acceleració de la gravetat en la superfície de Mart,  $g_{\text{Mart}} = 3,71 \text{ m s}^{-2}$   
Període orbital de Deimos,  $T_{\text{Deimos}} = 30,35 \text{ h}$   
Massa de Deimos,  $m_{\text{Deimos}} = 2 \times 10^{15} \text{ kg}$   
 $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$

- P2)** Hem construït aquesta gràfica a partir de dades de freqüència recollides quan una font de so es movia acostant-se a nosaltres (velocitats positives) o allunyant-se'n (velocitats negatives), a velocitats diferents.



- a)** Com s'anomena el fenomen que hem estudiat en aquest experiment? La font de so s'acosta a nosaltres amb un moviment rectilini uniforme (MRU) a  $100 \text{ m s}^{-1}$  i ens sobrepassa. Quin canvi de freqüència (expressada en Hz) sentirem en el moment en què passi just pel nostre costat? La freqüència que sentirem augmentarà o disminuirà?
- b)** La taula següent mostra com disminueix la intensitat sonora quan ens situem a diferents distàncies d'un emissor puntual de so.

|                              |       |       |        |        |        |        |        |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>Distància (m)</i>         | 5,0   | 10,0  | 15,0   | 20,0   | 25,0   | 30,0   | 35,0   |
| <i>I (mW m<sup>-2</sup>)</i> | 0,080 | 0,020 | 0,0089 | 0,0050 | 0,0032 | 0,0022 | 0,0016 |

Calculeu a quina distància, aproximadament, haurem d'estar perquè el nivell de sensació sonora sigui de 65 dB i calculeu la potència de la font sonora, suposant que emet igual en totes les direccions.

**DADA:** Intensitat del lllendar d'audició (0 dB),  $I_0 = 1,00 \times 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$

## OPCIÓ A

- P3)** El radó 222, de símbol Rn, és un gas noble responsable de bona part de l'exposició de les persones a les radiacions ionitzants. El  $^{222}\text{Rn}$  es forma al subsòl a partir del radi (Ra) i a causa del seu estat gasós es difon cap a l'atmosfera.
- a)** Quan el  $^{222}\text{Rn}$  es desintegra emet partícules  $\alpha$ . Escriviu l'equació nuclear d'aquest procés de desintegració.
- b)** A més de la radiació  $\alpha$ , durant el procés de desintegració també s'emeten raigs  $\gamma$  (no cal que els inclogueu en l'equació de l'apartat anterior). Calculeu la freqüència i la longitud d'ona d'un fotó  $\gamma$  d'energia 5,50 MeV.


**DADES:** Nombres atòmics: Bi, 83; Po, 84; At, 85; Rn, 86; Fr, 87; Ra, 88; Ac, 89.

$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\text{Constant de Planck, } h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

$$\text{Velocitat de la llum, } c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

- P4)** Dues esferes metàl·liques massisses pengen cadascuna d'un fil no conductor, com mostra la figura. Les dues esferes tenen la mateixa massa i la mateixa càrrega negativa de valor  $-5,80 \mu\text{C}$  i es troben en equilibri formant un angle de  $30^\circ$  amb la vertical. La distància des del punt  $P$  fins al centre de cada esfera és d'1,00 m.



- Calculeu el valor de la massa de cadascuna de les esferes.
- Calculeu el camp elèctric total (mòdul, direcció i sentit) en el punt  $P$ .

DADES:  $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

- P5)** En un selector de velocitats, un protó es mou en la direcció  $x$  en una regió amb camps creuats, on  $\mathbf{E} = 2,00 \times 10^5 \text{ N/C } \mathbf{j}$  i  $\mathbf{B} = 3,00 \times 10^3 \text{ G } \mathbf{k}$ .

- Dibuixeu un esquema dels camps i també de les forces que actuen sobre el protó. Quina és la velocitat del protó si no es desvia de la seva trajectòria rectilínia?
- Mentre el protó es mou sense desviar-se interrompem el camp elèctric. Calculeu el radi de curvatura de la trajectòria del protó.


DADES:  $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$

Càrrega del protó,  $Q_{\text{protó}} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$







Massa del protó,  $m_{\text{protó}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

## OPCIÓ B

- P3)** El copernici  $^{277}_{112}\text{Cn}$  va ser sintetitzat al laboratori del Centre per a la Recerca d'Ions Pesants (GSI) de Darmstadt (Alemanya) el 9 de febrer del 1999. El nom oficial data del febrer del 2010, en honor de Nicolau Copèrnic. Per a obtenir-lo, es bombardeja una diana de plom amb projectils d'àtoms de zinc. La reacció es pot escriure així:



El  $^{277}_{112}\text{Cn}$  es desintegra segons la seqüència següent:



El  $^{277}_{112}\text{Cn}$  té un període de semidesintegració de 0,17 ms.

- Completeu la reacció d'obtenció del  $^{277}_{112}\text{Cn}$  a partir de plom i de zinc. Quin tant per cent de  $^{277}_{112}\text{Cn}$  roman sense desintegrar-se al cap d'un minut d'haver-se produït la reacció d'obtenció d'aquest isòtop?
- Escriviu la seqüència o sèrie radioactiva (amb tots els símbols dels elements) fins a arribar al fermi.

DADES:


|                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| $^{82}_{\text{Pb}}$ | $^{110}_{\text{Ds}}$ | $^{108}_{\text{Hs}}$ | $^{106}_{\text{Sg}}$ | $^{104}_{\text{Rf}}$ | $^{102}_{\text{No}}$ | $^{100}_{\text{Fm}}$ | $^{30}_{\text{Zn}}$ |
| plom                | darmstadt            | hassi                | seaborgi             | rutherfordi          | nobeli               | fermi                | zinc                |

- P4)** En una zona de l'espai hi ha dues càrregues elèctriques puntuals de la mateixa magnitud però de signe contrari separades 20,0 cm.
- Calculeu l'energia potencial de la distribució de càrregues.
  - Quin treball cal fer per a separar les càrregues des d'una distància inicial de 20,0 cm fins a una distància final de 50,0 cm?

DADES: Valor absolut de cada càrrega = 1,00  $\mu\text{C}$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

- P5)** En una zona de l'espai hi ha un camp magnètic uniforme de 0,40 T. En aquesta regió hi ha una espira circular de 200  $\text{cm}^2$  d'àrea que gira a 191 rpm (revolucions per minut), tal com indica la figura.



- Si en l'instant inicial el camp magnètic és perpendicular al pla de l'espira, expresseu l'equació del flux magnètic que travessa l'espira en funció del temps.
- Quina és la força electromotriu (FEM) màxima generada per l'espira?



Institut  
d'Estudis  
Catalans

L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés