

GALICIA · PAU 2013 · ORDINARIA

Física

12 ejercicios

Instrucciones del examen

Puntuación máxima: Cuestiones 4 puntos (1 cada cuestión, teórica o práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado). No se valorará la simple anotación de un ítem como solución a las cuestiones; deben ser razonadas. Se puede usar calculadora siempre que no sea programable ni memorice texto. El/la alumno/a elegirá una de las dos opciones.

Ejercicio 1

OPCIÓN A 1 puntos

Se dispone de varias cargas eléctricas puntuales. Si en un punto del espacio próximo a las cargas el potencial eléctrico es nulo:

- a) puntos
puede haber campo eléctrico en ese punto
- b) puntos
las líneas del campo se cortan en ese punto
- c) puntos
el campo no es conservativo

Ejercicio 2

OPCIÓN A 1 puntos

Dos focos O_1 y O_2 emiten ondas en fase de la misma amplitud (A), frecuencia (ω) y longitud de onda (λ) que se propagan a la misma velocidad, interfiriendo en un punto P que está a una distancia λ m de O_1 y 3λ m de O_2 . La amplitud resultante en P será:

- a) puntos
nula
- b) puntos
 A
- c) puntos
 $2A$

Ejercicio 3

OPCIÓN A 1 puntos

Se produce efecto fotoeléctrico cuando fotones de frecuencia ν , superior a una frecuencia umbral ν_0 , inciden sobre ciertos metales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) 1 puntos

se emiten fotones de menor frecuencia

b) 1 puntos

se emiten electrones

c) 1 puntos

hay un cierto retraso temporal entre el instante de la iluminación y el de la emisión de partículas

Ejercicio 4

OPCIÓN A 1 puntos

La constante elástica de un resorte se puede medir experimentalmente mediante el método dinámico. Explica brevemente el procedimiento seguido en el laboratorio.

Ejercicio 5

OPCIÓN A 3 puntos

Un satélite de 200 kg describe una órbita circular de 600 km sobre la superficie terrestre.

a) 1 punto

deduce la expresión de la velocidad orbital

b) 1 punto

calcula el periodo de giro

c) 1 punto

calcula la energía mecánica

Ejercicio 6

OPCIÓN A 3 puntos

Un rayo de luz pasa del agua (índice de refracción $n = 4/3$) al aire ($n = 1$). Calcula:

a) 1 punto

el ángulo de incidencia si los rayos reflejado y refractado son perpendiculares entre sí

b) 1 punto

el ángulo límite

c) 1 punto

¿hay ángulo límite si la luz incide del aire al agua?

Ejercicio 7

OPCIÓN B 1 puntos

Un planeta describe una órbita plana y elíptica alrededor del Sol. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es constante?

- a) puntos
el momento lineal
- b) puntos
la velocidad areolar
- c) puntos
la energía cinética

Ejercicio 8

OPCIÓN B 1 puntos

Si se desea obtener una imagen virtual, derecha y menor que el objeto, se usa:

- a) puntos
un espejo convexo
- b) puntos
una lente convergente
- c) puntos
un espejo cóncavo

Ejercicio 9

OPCIÓN B 1 puntos

En la reacción ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + {}_Z^AX + 3{}_0^1\text{n}$ se cumple que:

- a) puntos
es una fusión nuclear
- b) puntos
se libera energía correspondiente al defecto de masa
- c) puntos
el elemento X es ${}_{35}^{92}\text{X}$

Ejercicio 10

OPCIÓN B 1 puntos

En la medida experimental de la aceleración de la gravedad g con un péndulo simple, ¿qué precauciones se deben tomar con respecto a la amplitud de las oscilaciones y con respecto a la medida del periodo de oscilación?

Ejercicio 11

OPCIÓN B 3 puntos

Un protón con velocidad $v = 5 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ penetra en una zona donde hay un campo magnético $B = 1 \text{ T}$.

a) 1 punto

Dibuja la fuerza que actúa sobre el protón y deduce la ecuación para calcular el radio de la órbita

b) 1 punto

calcula el número de vueltas en un segundo

c) 1 punto

¿varía la energía cinética del protón al entrar en esa zona?

Ejercicio 12

OPCIÓN B 3 puntos

Una partícula de masa $m = 0,1 \text{ kg}$, sujeta en el extremo de un resorte, oscila en un plano horizontal con un M.H.S., siendo la amplitud $A = 0,20 \text{ m}$ y la frecuencia $\nu = 5 \text{ s}^{-1}$, en el instante inicial la posición es $x = A$.
Calcular para $t = T/8 \text{ s}$:

a) 1 punto

la velocidad y aceleración

b) 1 punto

la energía mecánica

c) 1 punto

la frecuencia con que oscilaría si se duplica la masa