

ANDALUCÍA · PAU 2017 · ORDINARIA · RESERVA A

Matemáticas CCSS

8 ejercicios · 90 min de duración

Instrucciones del examen

El examen incluye tabla normal estándar como anexo. a) Duración: 1 hora y 30 minutos. b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Ejercicio 1

OPCIÓN A 2,5 puntos

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

a) 1 punto

Calcule $A^2 + B^3$.

b) 1,5 puntos

Calcule X en la ecuación matricial $(A + B) \cdot X = A - B$.

Ejercicio 1

OPCIÓN B 2,5 puntos

a) 1,2 puntos

Represente el recinto dado por las siguientes inecuaciones:

$$y \leq x + 3 \quad x + 5y \geq 3 \quad 2x + 7y \leq 30 \quad y \geq 0$$

b) 0,5 puntos

Razone si el punto $(5, 3)$ pertenece al recinto anterior.

c) 0,8 puntos

Obtenga los valores mínimo y máximo de la función $F(x, y) = x - y$ en ese recinto, indicando en qué puntos se alcanzan.

Ejercicio 2

OPCIÓN A 2,5 puntos

El beneficio en euros que obtiene una empresa al vender x unidades de un artículo viene dado por la función $B(x) = -x^2 + 360x - 18000$, $50 \leq x \leq 350$.

a) 0,8 puntos

¿Cuál es el beneficio obtenido si vende 100 unidades? ¿Cuántas unidades debe vender para obtener un beneficio de 13500 €?

b) 1 punto

¿Cuál es el número de unidades que debe vender para que el beneficio sea máximo? ¿A cuánto asciende ese beneficio?

c) 0,7 puntos

Represente gráficamente la función y determine cuántas unidades hay que vender para no obtener pérdidas.

Ejercicio 2

OPCIÓN B 2,5 puntos

Se considera la función $f(x) = \begin{cases} a & \text{si } x < 0 \\ x^2 - bx - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

a) 1,5 puntos

Calcule el valor de a y b , para que la función sea derivable en $x = 0$.

b) 1 punto

Para $a = 1$ y $b = 2$, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = 2$.

Ejercicio 3

OPCIÓN A 2,5 puntos

Sean A , B y C tres sucesos de los que se sabe que A y B son independientes, A y C son incompatibles, $P(A) = 0,4$, $P(A \cap B) = 0,1$ y $P(C) = 0,2$. Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos:

a) 1,25 puntos

Que suceda A si no sucede B .

b) 0,75 puntos

Que no suceda ni A ni C .

c) 0,5 puntos

Que si no sucede B tampoco suceda A .

Ejercicio 3

OPCIÓN B 2,5 puntos

Para superar una asignatura un estudiante hace un examen teórico y otro práctico. La probabilidad de que apruebe el examen teórico es 0,8, la de que apruebe el examen práctico es 0,6 y la de que apruebe ambos es 0,5.

a) 1 punto

¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos exámenes?

b) 1 punto

¿Cuál es la probabilidad de que apruebe el examen práctico en caso de no haber aprobado el examen teórico?

c) 0,5 puntos

¿Son independientes los sucesos "aprobar el examen teórico" y "aprobar el examen práctico"?

Ejercicio 4

OPCIÓN A 2,5 puntos

Se desea estimar el porcentaje de alumnos de un determinado instituto que lleva gafas. Para ello se eligen 300 alumnos, de los que 210 llevan gafas.

a) 1,5 puntos

Calcule el intervalo de confianza para la proporción de alumnos que lleva gafas, con un nivel de confianza del 97%.

b) 1 punto

Si por estudios en otros institutos se sabe que la proporción de alumnos que lleva gafas es del 70%, determine el tamaño mínimo de la muestra necesario para que, con una confianza del 97%, el error máximo que se cometa sea inferior a 0,06.

Ejercicio 4

OPCIÓN B 2,5 puntos

Se sabe que el peso de los tarros de mermelada que fabrica una empresa sigue una distribución Normal con desviación típica 25 g. Con objeto de estimar el peso medio de los tarros fabricados por esa empresa se selecciona una muestra aleatoria de 100 tarros de esa fábrica obteniéndose un peso medio de 230 g.

a) 1,3 puntos

Calcule un intervalo de confianza, al 96%, para la media de la población.

b) 0,2 puntos

¿Qué error máximo se ha cometido en el intervalo anterior?

c) 1 punto

Determine el tamaño muestral mínimo para que el error máximo cometido al construir un intervalo de confianza, con el mismo nivel de confianza, sea 2 g.