



COMPORTEMENT

Peu avant le poulinage, la jument paraîtra agitée, peut marteler le sol, garder la queue haute, lancer des regards répétés de chaque côté de son flanc (comme en cas de colique) et transpirer abondamment, même s'il ne fait pas chaud. Des petites déjections ou pertes d'urines fréquentes peuvent aussi indiquer une naissance imminente.

VENTRE



Après environ six mois, la jument peut montrer des signes de grossesse visible. Les juments ayant déjà pouliné peuvent montrer un ventre gonflé plus tôt qu'une jument primipare. Durant les mois restants, l'abdomen de la jument continuera de s'étendre à mesure que le poulinage, donc la date de la mise bas, approche. Son ventre semblera s'affaisser, indiquant que le poulain se positionne pour la naissance. Vous pourrez parfois observer ou sentir les mouvements du poulain.



Gestante et non gestante.

LIGAMENTS PELVIENS

Les muscles qui entourent la base de la queue de la jument se relâchent. Un creux se forme de chaque côté de la racine de la queue à mesure que les muscles des hanches et de la croupe commencent à se détendre. Par conséquent, la queue semble un peu plus haute que la normale. Il peut survenir 2 à 3 semaines avant le poulinage, mais aussi juste avant ou pas du tout...



Gestante et non gestante.

La jument gestante et le poulinage



INTRODUCTION

Les juments qui se trouvent à 90 % ou plus de la durée attendue de leur gestation ne sont pas considérées comme aptes au transport. La durée du dernier stade de gestation d'une jument peut varier fortement : la moyenne est de 335 jours, la durée oscillant entre 320 et 360 jours. Si le moment de l'insémination est connu, il est possible de calculer le moment attendu de la mise bas. Si le moment de l'insémination n'est pas connu, certains signes permettent de déterminer que la jument se trouve à un stade tardif de sa grossesse et que le poulain naîtra bientôt.



VULVE



Juste avant le poulinage, tout l'arrière-train de la jument se détend, dont sa vulve. Elle semblera plus longue et ne présentera plus autant de plis sur son côté.



Gestante, gestante et non gestante.

RÉSISTANCE DE LA QUEUE


À mesure que le poulinage approche, vous sentirez de moins en moins, voire plus aucune résistance lorsque vous lèverez la queue de la jument.



Gestante et non gestante.

PIS

Lorsque la date du poulinage approche, les mamelles de la jument s'engorgent et deviennent très tendues. Vers trois à six semaines avant la date de la mise bas, les mamelles commencent à gonfler. Quelques jours avant le poulinage, des perles de consistance cireuse ou des gouttelettes de lait peuvent apparaître au bout des mamelles. C'est ce qu'on appelle le cirage, un signe que le poulinage est très proche. Malheureusement, cette indication est incertaine, car certaines juments ne cirent pas du tout. Les juments perdent souvent quelques gouttes de lait, voire un jet constant, juste avant l'accouchement.



Gestante et non gestante.