

ANDALUCÍA · PAU 2017 · ORDINARIA

Matemáticas CCSS

8 ejercicios · 90 min de duración

Instrucciones del examen

a) Duración: 1 hora y 30 minutos. b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Ejercicio 1

OPCIÓN A 2,5 puntos

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

a) 1 punto

Calcule la matriz A^{2017} .

b) 1,5 puntos

¿Se verifica la expresión $(B + A) \cdot (B - A) = B^2 - A^2$?

Ejercicio 1

OPCIÓN B 2,5 puntos

Un distribuidor de software informático tiene en su cartera de clientes tanto a empresas como a particulares. Ha de conseguir al menos 25 empresas como clientes y el número de clientes particulares deberá ser como mínimo el doble que el de empresas. Por razones de eficiencia del servicio postventa, tiene estipulado un límite global de 120 clientes anuales. Cada empresa le produce 386 € de beneficio, mientras que cada particular le produce 229 €. ¿Qué combinación de empresas y particulares le proporcionará el máximo beneficio? ¿A cuánto ascenderá ese beneficio?

Ejercicio 2

OPCIÓN A 2,5 puntos

Sea $f(t)$ el porcentaje de ocupación de un determinado complejo hotelero en función del tiempo t , medido en meses, transcurrido desde su inauguración:

$$f(t) = \begin{cases} -\frac{5}{2}t^2 + 20t & \text{si } 0 \leq t \leq 6 \\ \frac{90t-240}{t+4} & \text{si } t > 6 \end{cases}$$

a) 0,5 puntos

¿Evoluciona la función f de forma continua?

b) 0,5 puntos

¿Cuál sería el porcentaje de ocupación al finalizar el segundo año?

c) 1 punto

¿En qué momentos el porcentaje de ocupación sería del 40%?

d) 0,5 puntos

¿Llegaría en algún momento a estar completo en caso de que estuviese abierto indefinidamente?

Ejercicio 2

OPCIÓN B 2,5 puntos

a) 1,5 puntos

Calcule la derivada de las siguientes funciones:

$$f(x) = \frac{e^{5x} - x}{x^2 - x}$$
$$g(x) = (2x^2 - x)^3 \cdot \ln(x^3 + 2)$$

b) 1 punto

Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $h(x) = \frac{1}{x}$ en el punto de abscisa $x = 1$.

Ejercicio 3

OPCIÓN A 2,5 puntos

Se sabe que el 90% de los alumnos de un centro docente está interesado por las redes sociales, el 60% está interesado por sus notas y el 55% por ambas cuestiones. Se elige al azar un alumno de ese centro.

a) 1 punto

¿Cuál es la probabilidad de que dicho alumno esté interesado por alguna de las dos cuestiones?

b) 1 punto

Calcule la probabilidad de que esté interesado por sus notas, sabiendo que no está interesado por las redes sociales.

c) 0,5 puntos

Calcule la probabilidad de que no esté interesado por ninguna de estas dos cuestiones.

Ejercicio 3

OPCIÓN B 2,5 puntos

En una ciudad hay dos fábricas de pasta, F_1 y F_2 , que producen dos tipos de productos, A y B , que venden a un distribuidor en paquetes de 1 kg. En un mes, la fábrica F_1 produce 20000 kg de pasta, de los que 12000 son del tipo A y la fábrica F_2 produce 25000 kg de pasta de los que 15000 kg son del tipo A . Se escoge al azar un paquete del distribuidor.

a) 1,5 puntos

¿Cuál es la probabilidad de que sea del tipo B ?

b) 1 punto

Si el paquete elegido resulta ser del tipo A , ¿qué es más probable, que proceda de la fábrica F_1 o que proceda de la F_2 ?

Ejercicio 4

OPCIÓN A 2,5 puntos

La altura de los estudiantes de 2º de bachillerato de un centro sigue una ley Normal de media 165 cm y desviación típica 10 cm.

a) 1 punto

¿Qué distribución sigue la altura media de las muestras de tamaño 25?

b) 1,5 puntos

Se elige al azar una muestra de 25 estudiantes y se les mide la altura. ¿Cuál es la probabilidad de que la altura media de esa muestra supere 160 cm?

Ejercicio 4

OPCIÓN B 2,5 puntos

La puntuación obtenida por los participantes en una prueba es una variable aleatoria que sigue una distribución Normal con una desviación típica de 6 puntos. Se toma una muestra aleatoria de 64 participantes en esa prueba, resultando una puntuación media de 35 puntos.

a) 1,25 puntos

Calcule un intervalo de confianza, al 95%, para la calificación media del total de participantes en la citada prueba.

b) 1,25 puntos

Halle el tamaño mínimo de la muestra necesaria para estimar la puntuación media del total de participantes, con un error inferior a 0,5 puntos y un nivel de confianza del 99%.

Tu Profe al Rescate