

ASTURIAS · PAU 2012 · ORDINARIA · 1

Física

8 ejercicios

Instrucciones del examen

Ejercicio 1

OPCIÓN A 2,5 puntos

Una carga $q_1 = 2 \mu\text{C}$ está situada en el punto $P_1(0, 0)$ y otra $q_2 = 1 \mu\text{C}$ está situada en $P_2(1 \text{ m}, 0)$.

a) puntos

¿Hay algún punto del espacio donde el campo eléctrico se anule? Si es así determínelo, y en caso contrario explique por qué no existe.

b) puntos

Suponiendo potencial nulo en el infinito, ¿hay algún punto donde el potencial eléctrico se anule? Si es así determínelo, y en caso contrario explique por qué no existe.

Ejercicio 1

OPCIÓN B 2,5 puntos

Se producen ondas estacionarias en una cuerda de longitud $2,5 \text{ m}$ bajo tensión sujeta por ambos extremos. La velocidad de propagación de las ondas transversales en la cuerda es de 50 m/s .

a) puntos

Realice un esquema del modo fundamental.

b) puntos

Determine el número de ondas del modo fundamental;

c) puntos

Determine la frecuencia del modo fundamental;

d) puntos

Si la cuerda se sujeta por un punto situado a $0,5 \text{ m}$ de un extremo, ¿qué dos frecuencias fundamentales aparecen?

Ejercicio 2

OPCIÓN A 2,5 puntos

Cuando chocan a velocidad despreciable un electrón y su antipartícula (el positrón) la masa total de ambos se transforma en energía que llevan dos fotones de luz iguales. Determine:

a) puntos

la energía total producida;

b) puntos

la frecuencia de la luz producida;

c) puntos

la longitud de onda en el vacío de la luz producida.

Ejercicio 2

OPCIÓN B 2,5 puntos

Determine la velocidad de escape de un objeto de 2 kg de masa en la Luna, la cual (casi esférica) posee una masa de $7,36 \times 10^{22}$ kg y un radio de 1740 km. Si deseamos la velocidad de escape de un objeto de 10 kg, ¿cómo se modifica el resultado anterior?

Ejercicio 3

OPCIÓN A 2,5 puntos

a) 1 punto

Explique el fenómeno de la refracción de ondas. Incluya un esquema.

b) 1,5 puntos

Se conecta un muelle a una partícula de masa 2,0 kg, poniéndose el sistema a oscilar. Si se duplica la masa, ¿qué relación existe entre la nueva frecuencia de oscilación y la antigua?

Ejercicio 3

OPCIÓN B 2,5 puntos

a) 1 punto

¿A qué velocidad se mueven en el aire las ondas de radio generadas por un teléfono móvil? (Explíquese.)

b) 1,5 puntos

Un electrón tiene una longitud de onda asociada 10^{-11} m. Si se duplica su velocidad, ¿cuál será su nueva longitud de onda?

Ejercicio 4

OPCIÓN A 2,5 puntos

a) 1 punto

Enuncie el principio de Huygens (incluya algún esquema).

b) 1,5 puntos

En un experimento de laboratorio se utiliza un muelle vertical sujeto a un techo. Del muelle se van colgando masas diferentes y se miden los alargamientos del muelle obteniéndose los siguientes valores: Utilizando un método gráfico, determine la constante del muelle, si la aceleración de la gravedad en el lugar es $9,77 \text{ m/s}^2$.

Ejercicio 4

OPCIÓN B 2,5 puntos

a) 1 punto

¿Qué es el efecto fotoeléctrico?

b) 1,5 puntos

En un experimento para determinar el índice de refracción de un vidrio se hacen llegar rayos incidentes a una superficie plana desde el aire hacia el vidrio. Se han obtenido los siguientes resultados (en grados sexagesimales): Utilizando un método gráfico determine el índice de refracción del vidrio.